

Avertissements[®]

agricoles Lorraine

Bulletin n° 18 du 6 juillet 1989

Numérotation continue : n° 99

Grandes cultures

MAIS : Pyrale : Pleine période d'intervention.

POIS :

- Maladies : pas d'intervention.
- Tordeuses : seuil non atteint.

TOURNESOL : Surveiller le mildiou.

MAIS :

- **Pyrale :**

Le vol se poursuit.

Le niveau des captures en piège sexuel et les sorties en cage d'élevage restent faibles. Le vol semble donc moins important cette année.

A ce jour, aucun dépôt de pontes n'a été observé ni à Dieue (55) ni à Mervillers (54).

* Préférez l'emploi des micro granulés (maïs supérieur à 70 cm) dont la toxicité à l'égard des insectes auxiliaires est moindre. Vous limiterez ainsi les risques de pullulation de pucerons.

* Si une intervention se justifie, elle **devra être réalisée avant le 10-12 juillet.**

POIS :

Stade gousses pleines du 2e niveau.

- **Maladies :**

Quelques symptômes de Botrytis sont visibles dans les parcelles mais sur l'ensemble de la région, le niveau des maladies ne justifie pas de traitement.

TOUTE REPRODUCTION, MEME PARTIELLE, EST SOUMISE A NOTRE AUTORISATION

Imprimerie de la Station de NANCY

Directeur-Gérant : D. VERBEKE

Publication Périodique

CPPAP No : 2011 AD

Abonnement annuel : 190 F

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

38. rue Sainte-Catherine

54043 NANCY CEDEX

Tél. 83 30 41 51



P 172

- Tordeuses :

Situation au 5/07/89

LIEU	CAPTURES CUMULEES
MEXY (54)	2
SANCY (54)	90
LUMEVILLE EN ORNOIS (55)	41
MENIL SUR SAULX (55)	27
SAINT HILAIRE (55)	15
SECOURT (57)	15
OTTANGE (57)	10

Le seuil d'intervention étant de 400 captures cumulées au piège sexuel au stade gousse pleine du 2e étage de fructification, **il n'y a donc pas lieu d'intervenir.**

TOURNESOL :

- Information - Observation : Mildiou

Suite à l'apparition d'une nouvelle race de mildiou du Tournesol dans le centre de la France, le Service de la Protection des Végétaux tient à détecter l'apparition éventuelle de ce champignon dans d'autres régions.

Pour ce faire, vous voudrez bien **nous signaler tout symptôme** qui pourrait correspondre à la description suivante :

Les plantes ont des hauteurs variables (30 à 80 cm), les feuilles situées sous le bourgeon terminal présentent un feutrage blanc à la surface inférieure du limbe ainsi que des taches vert-jaune internervaires ("point de tapisserie"), plus ou moins anguleuses. Les feuilles sont cassantes à la flexion. Enfin certaines plantes présentent un développement normal mais des taches foliaires isolées.

Un prélèvement pour analyse sera alors réalisé si les symptômes sont confirmés.

